GIORNALE BOTANICO ITALIANO

FONDATA NEL 1844

PUBBLICATO DALLA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA
CON IL CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

1888-1988 **CENTENARIO DELLA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA**

Vol. 122, n. 1-2 Supplemento 1, 1988

Publicato con il contributo
del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
Direzione Generale per l'Economia Montana
e per le Foreste

Relazioni e dimostrazioni
presentate in occasione
dell'83° Congresso Sociale
Firenze 8-12 Gennaio 1988

C.A. Accorsi* e G. Rodolfi°

* Istituto e Orto Botanico dell'Università di Modena

° Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo, Firenze

La Pedopalinoologia (Palinoologia dei suoli/paleosuoli) è un settore abbastanza recente della Palinologia a indirizzo fitogeografico. A lato di una innegabile complessità per i vari problemi in essa coinvolti (presenza pollinica non garantita, e comunque calante con la profondità, sospetti di corrosioni differenziali e di infiltrazioni polliniche superficiali...), la Pedopalinoologia ha un alto interesse vegetazionale/ambientale per la competenza a far luce su aspetti e trasformazioni locali del paesaggio che nei diagrammi dei depositi torbo-lacustri sfuggono o restano in sottofondo (DIMBLEBY G., *J. Soil Sc.* 12:1-11, 1961; HAVINGA A., *Geol. Mijnb.* 53:449-453, 1974; JUNGIERUS P., *Geol. Mijnb.* 62:537-544, 1983).

In Italia le indagini pedopalinoologiche hanno preso impulso nell'ultimo decennio. Oltre a ACCORSI e RODOLFI, che hanno sviluppato vari lati con letture dei diagrammi da visuali (geobotanica/pedologica/geomorfologica) sovrapposte, ricordiamo altri AA che hanno operato su questa linea di ricerca: BANDINI, BERTOLANI, FORLANI, SPERANZA, TREVISAN. I diagrammi, 15 pubblicati più altri 10ca di cui è stata data sintetica comunicazione, vengono da profili in situazioni vegetazionali diversificate: boschi planiziari, castagneti, faggete, brughiere appenniniche, praterie alpine. La maggior parte dei profili riguarda l'Italia settentrionale, alcuni l'Italia centrale (BERTOLANI D. & Al., *Giorn. Bot. It.* 105:179, 1971; ACCORSI C. & RODOLFI G., *Boll. Soc. It. Sc. Suolo* 9:35-51, 1975; ACCORSI C. & Al., *Geogr. Fis. Din. Quat.* 5:345-349, 1982). Temi emersi dai diagrammi sono: le variazioni del limite altitudinale del bosco, la formazione di praterie secondarie, la sopravvivenza del pino silvestre nella fascia collinare, il diradamento mesolitico sui querceti montani boreali, le evidenze di processi erosivi e di apporti colluviali. I tempi documentati nei diagrammi (anche con date ^{14}C e/o riferimenti archeologici), spesso compresi nel Subatlantico, si arretrano talora al Preboreale. Al di là delle specifiche informazioni che ogni diagramma fornisce, uno sguardo panoramico all'insieme di essi coglie, sul fondo di un generale accordo con le sequenze torbo-lacustri, una logica comune e originale negli apporti pedopalinoologici alla storia floristico-climatica/paleoambientale italiana: possibilità di indagare una molteplicità di ambienti, possibilità di isolare singoli problemi geobotanici con incentivo a raggiungere nei censimenti pollinici della vegetazione passata i livelli di dettaglio possibili nei censimenti della vegetazione d'oggi, possibilità di portare spiegoni alla ricostruzione degli eventi della pedogenesi e della evoluzione delle forme del paesaggio.